

Krätze (Skabies)

Krätzmilben werden bei engem Hautkontakt und ggfs. durch kontaminierte Stoffe übertragen.

Unabhängig davon, ob Kontaktpersonen eines erkrankten Kindes Hautveränderungen haben oder nicht, sollen alle Mitglieder einer Familie gleichzeitig gegen Skabies behandelt werden.

Für die Behandlung der Krätze gibt es 3 Möglichkeiten:

Behandlung mit Permethrin 5% (z.B. Infectoscab): Behandler soll Einmalhandschuhe tragen!

1. **Nägel kürzen**, Ganzkörperbad nehmen, ca. 60 Minuten warten
2. Einmalig für **8-12 Stunden** Creme auftragen, trocknen lassen
 - Kinder >3Jahre, Jugendliche und Erwachsene ab Unterkiefer abwärts, hinter den Ohren, Finger/Zehenzwischenraum, unter Nägel!
 - Säuglinge (ab 3. Monat), Kinder < 3 Jahre **zusätzlich** Behandlung des Kopfes mit Aussparung der Augen-und Mundregion
3. Abduschen
4. 36 Stunden engen Körperkontakt meiden
5. Anwendung nach 14 Tagen wiederholen

Behandlung mit Benzylbenzoat (z.B. Antiscabiosum 10%, 25%): Behandler soll Einmalhandschuhe tragen!

1. **Nägel kürzen**, Ganzkörperbad nehmen, ca. 60 Minuten warten
2. Emulsion ab Unterkiefer abwärts, hinter den Ohren, Finger/Zehenzwischenraum, unter Nägel auftragen und trocknen lassen
3. Nach 24 Stunden duschen, 60 Minuten warten, **Anwendung wiederholen!**
4. **Erneut** nach 24 Stunden duschen, 60 Minuten warten, **Anwendung wiederholen!**
5. Abduschen
6. 36 Stunden engen Körperkontakt meiden
7. Anwendung nach 14 Tagen wiederholen

Behandlung mit der oralen Gabe von Ivermectin (ggfs. im Abstand von 2 Wochen wiederholen)

Zusätzliche wichtige allgemeine Hygieneregeln für eine erfolgsversprechende Behandlung:

- Nach Abduschen der Lokalthherapie vollständig neue Wäsche anziehen, Betten neu beziehen
- alle benützten Textilien (Kleider, Bettwäsche, Handtücher,..) mind. 60°C waschen
- Schuhe, Plüschtiere,... **4 Tage** in einer Plastiktüte bei Raumtemperatur (**über 20°C trocken verschlossen**) lagern
- Reinigung aller Kontaktflächen (Desinfektion nicht nötig)
- **Saugen** von Polstermöbeln, Kissen, Betten, Matratzen, Teppichen, Böden, Autositzen, ggfs.4 Tage lang nicht benutzen
- **Tragen von Einmalhandschuhen bei allen diesen Tätigkeiten**